

Azufre Mojable

Ficha Técnica

- **Nombre del Producto:** Azufre Mojable.
- **Presentación:** El producto se presenta como un polvo ocre especialmente formulado para su suspensión en agua, envasado en bolsas impresas y palletizado.

Cada bolsa exhibe el número de lote de fabricación y cada entrega se realiza con el correspondiente Certificado de Análisis que garantiza el cumplimiento de las especificaciones de calidad. Se encuentra inscripto en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por el SENASA con el certificado N° 34.653

Fitotoxicidad

El azufre presenta riesgos de fitotoxicidad en climas calmos y con altas temperaturas. No aplicar con temperaturas superiores a los 25°, ni simultáneamente con aceites, aplicarlos con al menos 20 – 30 días de separación de lo contrario puede haber quemaduras en hojas y frutos. En vides suspender los tratamientos al comienzo del invierno.

Compatibilidad

No mezclar con aceites ni con otros productos emulsionantes.
Es compatible con concentrados solubles, y con polvos mojables y/o solubles.

Parámetro	Unidad	Mínimo	Máximo
Pureza (como S)	g / 100g	80	-
Acidez	g / 100g	-	0.01
Suspensibilidad en agua blanda	g / 100g	70	-
Suspensibilidad en agua dura.	g / 100g	60	-
Humectabilidad	segundos	-	30
Retenido #325	g / 100g	-	0.5

Dosis

Cultivo	Plagas que controla	Dosis / HI	Momento de aplicación
Vid	Oídio: <i>Oidium Tuckeri</i> , <i>Uncinula necator</i>	100 gr. 200-300 gr.	Aplicaciones preventivas desde que los brotes tienen 10 a 15 cm.
	Erinosis de la vid: <i>Eriophyes vitis</i>	300-500 gr.	Al parecer los primeros síntomas.
Manzano	Oídio	300-500 gr.	Pre-floración
Peral	<i>Podosphaera leucotricha</i>	200-300 gr. 100-200 gr.	Caída de pétalos Tratamientos posteriores
	Erinosis del peral: <i>Eriophyes pyri</i>	300-500 gr.	Al parecer los primeros síntomas.
Tomate	Oídiopsis (<i>Oidiopsis taurica</i>)	250-500 gr.	Al parecer los primeros síntomas.
Rosal	Mancha negra: <i>Diplocarpon rosae</i>	250-500 gr.	Al iniciar la brotación repitiendo cada dos semanas.
	Oídio: <i>Sphaerotheca pannosa</i>		
Cítricos	Acaro del tostado: <i>Phyllocoptruta oleivora</i>	200-300 gr.	Como preventivo de 1ra. Aplicación
	Acaro de la lepra explosiva: <i>Brevipalpus obavatus</i>		Prefoliación, la 2 floración, a caída de pétalos.
	Acaro del platedado: <i>Eutetranychus banksi</i>		3 Aplicación con dosis menor.
Pepino Melón Zapallo	Oídio: <i>Erysiphe oichoracearum</i> , <i>Oidium ambrosiae</i>	200-300 gr.	Hacer aplicaciones cada dos semanas.
Duraznero	Oídio: <i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Oidium leucoconium</i>	200-300 gr.	1ra Aplicación: a yema hinchada. 2da Aplicación: al aparecer los signos de la enfermedad



Usos del Producto:

El Azufre Mojable Micronizado Juan Messina es un fungicida preventivo de acción de contacto.

El Azufre presenta riesgos de fitotoxicidad en climas calmos y con altas temperaturas.



Azufre Mojable

AZUFRE MICRONIZADO MOJABLE

ESPECIFICACIONES			
Parámetro	Unidad	Mínimo	Máximo
Pureza – Azufre.	% (p/p)	80.0	-
Inerte.	% (p/p)	9.00	11.00
Suspensibilidad.	% (p/p)	60.0	-
Retenido en malla # 325.	% (p/p)	-	0.50
Humectabilidad.	Segundos	-	30
Persistencia a la espuma.	mL	-	60
Color	Amarillo Pardo.		
Aspecto	Sólido en polvo libre de impurezas visibles.		

Juan Messina S.A. - Industrias Químicas
Sarmiento 451 - Villa Nueva - Guaymallén
Mendoza - Arg. / info@juanmessina.com.ar

Tel/Fax: +54 261 4450909
www.juanmessina.com.ar